

Iberogast®

ADVANCE

S1-Leitlinien-Update

Die
Nr.1*

Für die medikamentöse
First-line bei FD¹

Bei wiederkehrenden Beschwerden

Häufig und/oder wiederkehrend auftretende funktionelle Magen- und Darm-Beschwerden, z.B. bei



anhaltender
Stressbelastung



empfindlichem
Magen-Darm-Trakt



Reizmagen



Reizdarm

Gut zu wissen:

Iberogast® ADVANCE:

- ist ab 12 Jahren zugelassen
- in der S3-Leitlinie für Reizdarm als Therapieoption aufgeführt²
- als grünes Rezept bei vielen Krankenkassen erstattungsfähig

Für wen ist Iberogast® ADVANCE geeignet?



Julia (36)

3-fache Mutter,
beruflich stark
eingespannt, chronische
funktionelle Magenschmerzen
bzw. Magenkrämpfe
seit 6 Monaten



Christian (23)

Student,
regelmäßig Sodbrennen,
Völlegefühl und
Übelkeit, besonders
in Prüfungsphasen



Susanne (68)

Rentnerin,
pflegt ihren kranken
Ehemann, rezidivierende
funktionelle Bauchkrämpfe
und Blähungen

Mit 6 Heilpflanzenextrakten gegen gastrointestinale Inflammation und Hypersensitivität

Hochdosierte Kümmel-, Kamille-, Melisse- & Pfefferminzextrakte wirken **entzündungshemmend** und **beruhigend**.

Kümmel & Kamille wirken **mukosaprotektiv** auf Magen und Darm.

Iberis & Süßholz **regulieren die Säure**.


Iberis amara	
Kamillenblüten	
Kümmelfrüchte	
Melissenblätter	
Pfefferminzblätter	
Süßholzwurzel	

Die Anzahl der Blätter steht für den **Anteil** der Heilpflanzenextrakte in Iberogast® ADVANCE. Ein Blatt entspricht **5 ml in einer 100 ml Flasche**.


Wirksamer als Placebo, aber ebenso verträglich

- Multizentrische, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie bei Patient*innen (n = 272) mit funktioneller Dyspepsie³
- Dosierung: 3x20 Tropfen jeden Tag über 8 Wochen
- Primärer Endpunkt: eine $\geq 50\%$ ige Verbesserung des gastrointestinalen Summenscores (GIS) bei ≥ 3 von 4 Visiten
- Verträglichkeit auf Placebo-Niveau: kein Unterschied zwischen Iberogast® ADVANCE und Placebo

Signifikanter Anteil an Respondern



Relevante Besserung der Symptome



* Ansprechen (%) anhand des gastrointestinalen Summenscores (primärer Endpunkt, GIS): Ausprägung epigastrischer Schmerzen, Bauchkrämpfe, Völlegefühl, frühe Sättigung, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen, retrosternales Beschwerden und saures Aufstoßen/Sodbrennen.

Quellen:

¹ Storr M et al. S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM) zur funktionellen Dyspepsie (Reizmagen), einer Disorder of Gut-Brain Interaction (DGBI). Z Gastroenterol 2025; 63(04):403-422. ² Layer P et al. Update S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom. Z Gastroenterol 2021; 59: 1323-1415. ³ Vinson B und Holtmann G. Efficacy and safety of STW 5 II in patients with functional dyspepsia: results from a double-blind, randomized, multicenter trial. Z Gastroenterol 2020; 58(08): e179.

Iberogast® ADVANCE. Zusammensetzung: Wirkstoffe in 100 ml Flüssigkeit sind: Auszug aus frischer, bitterer Schleifenblume-Ganzpflanze (1:1,5-2,5) 15,0 ml, Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V) sowie Auszüge aus: Kamillenblüten (1:2-4) 30,0 ml; Kümmelfrüchten (1:2,5-3,5) 20,0 ml; Melissenblättern (1:2,5-3,5) 15,0 ml; Pfefferminzblättern (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Süßholzwurzeln (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Auszugsmittel für alle Arzneidroge: Ethanol 30 % (V/V). **Anwendungsgebiete:** Pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Erkrankungen. Behandlung von funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagensyndrom (funktionelle Dyspepsie) und Reizdarmsyndrom (Colon irritabile). **Gegenanzeigen:** Allergie gegen die Wirkstoffe. Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen. **Nebenwirkungen:** Nicht bekannt: Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht werden. Diese / r kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen mitteilen. **Warnhinweis:** Enthält 240 mg Alkohol (Ethanol) pro Dose / r. **Stand der Schweregrad:** 09/2023. **Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen, Deutschland.**