

**Tolak 40mg/g Creme**

**Wirkst.: Fluorouracil**

**Zus.:** 1 g Creme enthält 40 mg Fluorouracil.

**Sonst. Bestandt.:** Macrogolglycerolstearate, Butylhydroxytoluol (E 321), Cetylalkohol, Citronensäure (E 330), Glycerol (E 422), Isopropylmyristat, Methylgluceth-10, Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), gereinigtes Wasser, raffiniertes Erdnussöl, Natriumhydroxid (E 524), Stearinsäure und Stearylalkohol.

**Warnhinweis:** Enthält Butylhydroxytoluol, Erdnussöl, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Stearylalkohol. Packungsbeilage beachten.

**Anwend.:** topische Behandlung der nicht hyperkeratotischen, nicht hypertrophen aktinischen Keratose (Grad I und II nach Olsen) von Gesicht, Ohren und/oder Kopfhaut bei Erwachsenen.

**Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Inhaltstoffe, Überempfindlichkeit gegen Erdnuss oder Soja, Schwangerschaft, Stillzeit, zusammen mit Brivudin, Sorivudin und Analoga (starke Hemmstoffe des 5-FU abbauenden Enzyms Dihydropyrimidin-Dehydrogenase), da diese zu einer starken Erhöhung der Plasmakonzentration von 5-FU und der damit einhergehenden Toxizität führen.

**Nebenw.:** Häufig: Hautreaktionen am Anwendungsort (Reizung, Schmerzen, Hautreaktionen, Erythem, Pruritus, Entzündung, Ödem) Augenreizung.

Gelegentlich: Impetigo, Pharyngitis, Schlaflosigkeit, Beschwerden an der Nase, Lippenbläschen, Übelkeit, Schwellung um die Augen (Ödem), erhöhte Tränensekretion, Hautreaktionen an der Anwendungsstelle: Blutung, Erosion, Dermatitis, lokale Beschwerden, Trockenheit, Parästhesie, Lichtempfindlichkeitsreaktion.

Häufigkeit nicht bekannt: Allergische Reaktion (Kontaktexzem).

**Verschreibungspflichtig.** Weitere Hinweise: siehe Fachinformation. Stand: August 2020  
Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, Postfach 6769, 79043 Freiburg

**Referenz aktuelle Fachinformation (FI):**

Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH  
TOLAK® 40mg/g Salbe  
August 2020

**Version des PT / der KFI basierend auf o.a. FI:** Version 1.2 vom 03.02.2022