

Dropizol® 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung. **Wirkstoff:** eingestellte Opiumtinktur. **Zusammensetzung:** 1 ml Flüssigkeit zum Einnehmen enthält 1 ml Tinktur aus Papaver somniferum L. Trockensaft (Rhopium), entsprechend 10 mg Morphin. 1 Tropfen enthält 50 mg Opiumtinktur, entsprechend 0,5 mg (10 mg/ml) Morphin-Anhydrat. 1 ml = 20 Tropfen. Lösungsmittel zur Extraktion: 33 Vol.-% Ethanol. Sonstige Bestandteile: 33 Vol.-% Ethanol, Ethanol 96 Vol.-%, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** zur Behandlung schwerer Durchfälle bei Erwachsenen, wenn durch Anwendung anderer Antidiarrhoika keine ausreichende Wirkung erzielt wurde. **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der anderen Bestandteile (Ethanol, Wasser), Opiatabhängigkeit, Glaukom, schwere Leber- oder Nierenfunktionseinschränkungen, Delirium tremens, schwere Kopfverletzung, Risiko eines paralytischen Ileus, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), akutes Asthma, schwere Atemdepression mit Hypoxie und/oder Hyperkapnie, sekundäre Herzinsuffizienz bei Lungenerkrankungen (Cor pulmonale) und Stillen. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Schläfrigkeit, Obstipation, Mundtrockenheit. Häufig: Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Miosis, Bronchospasmus, abgeschwächter Husten, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Dysgeusie, Harnretention, Asthenie, Urticaria, vermehrtes Schwitzen. Gelegentlich: Atemdepression, Tachykardie, Bradykardie, Palpitationen, Gesichtsröte, Harnröhrenspasmus, Pruritus, Anstieg der Leberenzymwerte. Selten: orthostatische Hypotonie, Anstieg der Pankreasenzyme und Pankreatitis, Gallenkolik, Nierenkolik, Entzugssymptome. Sehr selten: Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH), Amenorrhoe, Muskelkrämpfe, Krampfanfälle, Allodynie und Hyperalgesie, verschwommenes Sehen, Diplopie, Nystagmus, Dyspnoe, Ileus, Bauchschmerzen, Exanthem, periphere Ödeme, Unwohlsein, Zittern. Häufigkeit nicht bekannt: Nebenniereninsuffizienz, Euphorie, unwillkürliche Muskelkontraktionen, Abhängigkeit, Dysphorie, Unruhe, verminderte Libido/Potenz, Halluzinationen, Hyperthermie, Vertigo. **Verschreibungspflichtig.** **Pharmazeutischer Unternehmer:** Pharmanovia A/S, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv, DK-2300 Kopenhagen S, Dänemark. Stand der Information: September 2021