

* ITP = Immunthrombozytopenie

Δ Definition Versorgungslücke:

- Empfohlene Therapiedauer für Steroide gemäß Onkopedia ITP-Leitlinie: 3 bis max. 6 Wochen²
- Zulassung von Eltrombopag ab 6 Monaten nach Diagnosestellung und Refraktärität gegenüber anderen Therapien (z.B. Kortikosteroide, Immunglobuline)⁴
- Fostamatinib wird angewendet zur Behandlung der chronischen ITP bei erwachsenen Patienten, die gegenüber anderen Behandlungsarten therapieresistent sind.⁵
- Avatrombopag wird angewendet zur Behandlung von primärer chronischer ITP bei erwachsenen Patienten, die auf andere Therapien (z. B. Kortikosteroide, Immunglobuline) nicht ansprechen.⁶
- Vorherige Zulassung von Nplate[®] nur bei chronischer ITP,
jetzt bei Erwachsenen unmittelbar nach Steroidversagen zugelassen¹

Referenzen

1. Fachinformation Nplate[®]
2. Matzdorff A et al. Immunthrombozytopenie (ITP). Onkopedia-Leitlinie. Stand: März 2021.
3. Newland A et al. Br J Haematol 2016; 172: 262–273.
4. Fachinformation Revolade[®]
5. Fachinformation Tavlesse[®]
6. Fachinformation Doptelet[®]

