

**Brivudin Aristo® 125 mg Tabletten (Rp)**

---

Wirkstoff: Brivudin

**Zus.:**

1 Tbl. enth.: 125 mg Brivudin. *Sonst. Bestandt.:* Mikrokristalline Cellulose, Lactosemonohydrat, Crospovidon (Typ B), Povidon K 30. **Anw.:** Zur frühen Behandlung eines akuten Herpes zoster bei immunkompetenten Erwachsenen. **Gegenanz.:** Überempf. geg. d. Wirkstoff od. ei. d. sonst. Bestandteile; keine Anwendung bei Patienten, die eine Krebs-Chemotherapie erhalten, insbes. wenn die Behandlung mit 5-Fluorouracil (5-FU), einschließlich topischer 5-FU-Präparate und 5-FU-Prodrugs (z. B. Capecitabin, Floxuridin, Tegafur), Kombinationsarzneimitteln mit diesen Wirkstoffen oder anderen 5-Fluoropyrimidinen erfolgt; keine Anwendung bei antimykotischer Therapie mit Flucytosin [Prodrug von 5-Fluorouracil (5-FU)]; keine Anwendung bei immunsupprimierten Patienten (z. B. Patienten unter Krebs-Chemotherapie, immunsuppressiver Therapie); Anwendung bei Kindern nicht angezeigt. **Schwangerschaft/Stillzeit:** kontraindiziert. **Nebenwirk.:** Häufig: Übelkeit. Gelegentlich: Granulozytopenie, Eosinophilie, Anämie, Lymphozytose, Monozytose; Allergische / Überempfindlichkeitsreaktionen (peripheres Ödem und Ödem im Bereich von Zunge, Lippen, Augenlidern, Larynx und Gesicht, Pruritus, Hautausschlag, vermehrtes Schwitzen, Husten, Dyspnoe, Bronchokonstriktion); Anorexie; Insomnie, Angsterkrankung; Kopfschmerzen, Benommenheit, Vertigo, Somnolenz, Parästhesie; Hypertonie; Erbrechen, Diarrhoe, Dyspepsie, Abdominalschmerzen, Obstipation, Flatulenz; Fettleber, erhöhte Leberenzyme; Asthenie, Müdigkeit, grippeähnliche Erkrankung (Unwohlsein, Fieber, Schmerzen, Schüttelfrost). Selten: Thrombozytopenie; Halluzinationen, Verwirrtheitszustand; Dysgeusie, Tremor; Ohrenscherzen; Hypotonie; Hepatitis, erhöhte Bilirubinkonzentration im Blut; Knochenschmerzen. Nicht bek.: Gleichgewichtsstörung; Vaskulitis; akutes Leberversagen; fixes Exanthem; exfoliative Dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom; Hepatotoxische Wirkungen. (verschreibungspflichtig). (Stand August 2018).

**Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlin.**