

## Referenzen:

\* In Bezug auf die prozentuale BMD-Änderung vom Ausgangswert nach 12 Monaten.

- 1 Cummings SR et al. N Engl J Med 2009;361(8):756–765.
- 2 Bone HG et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5(7):513–523.
- 3 Prolia® Fachinformation.
- 4 Hadji P et al. Dtsch Arztebl Int 2013;110(4):52–57.
- 5 IOF international: Osteoporosis and musculoskeletal disorders: Who's at risk?  
[www.iofbonehealth.org/whos-risk](http://www.iofbonehealth.org/whos-risk).
- 6 The Breaking Spine: an IOF-Report (2010); [www.iofbonehealth.org/breaking-spine-report-2010](http://www.iofbonehealth.org/breaking-spine-report-2010).
- 7 Bundesverband Deutscher Internisten e. V. Internisten im Netz. Osteoporose: Warnzeichen und Symptome. [www.internisten-im-netz.de/krankheiten/osteoporose/warnzeichensymptome.html](http://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/osteoporose/warnzeichensymptome.html).
- 8 OSTAK Expertengespräch: Schmerzen bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen. 3./4. Dezember 2010, Köln. [www.ostak.de/wp-content/uploads/2017/09/Schmerzen-beiosteoporotischen-Wirbelkörperfrakturen.pdf](http://www.ostak.de/wp-content/uploads/2017/09/Schmerzen-beiosteoporotischen-Wirbelkörperfrakturen.pdf).
- 9 Icks A. Gesund und mobil im Alter. Ärztekammer Nordrhein. [www.aekno.de/downloads/archiv/2003.08.011.pdf](http://www.aekno.de/downloads/archiv/2003.08.011.pdf).
- 10 Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2018.
- 11 DVO Leitlinie Osteoporose 2017: Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern.  
[www.dvosteologie.org/uploads/Leitlinie%202017/Finale%20Version%20Leitlinie%20Osteoporose%202017\\_end.pdf](http://www.dvosteologie.org/uploads/Leitlinie%202017/Finale%20Version%20Leitlinie%20Osteoporose%202017_end.pdf).
- 12 Miller PD et al. Osteoporos Int 2020;31(1):181–191.