

THERAPIEBEGINN IN EINFACHEN SCHRITTEN

VORBEREITEN^m



- Nadel aufschrauben



- Durchfluss vor der ersten Injektion testen




- Dosis einstellen


INJIZIEREN^m



- Ozempic[®] kann in Bauch, Oberschenkel oder Oberarm injiziert werden



FERTIG^m



- Nadel entfernen, Pen verschliessen

- ✓ Anwendung 1x pro Woche
- ✓ 1 Pen für 4 Injektionen
- ✓ Nadel nach jeder Injektion wechseln
- ✓ Nadeln inklusive

Kurzdarstellung. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsinformation!^m

Lagerung des Pens



Vor dem Öffnen

Im Kühlschrank bei 2–8°C



Nach dem Öffnen

Bei Temperaturen unter 30°C bzw. im Kühlschrank bei 2–8°C maximal sechs Wochen

Vergessene Anwendung

Falls eine Anwendung ausgelassen wird, sollte diese so schnell wie möglich und **innerhalb von 5 Tagen** nach dem Auslassen nachgeholt werden.

Falls **mehr als 5 Tage** verstrichen sind, sollte die ausgelassene Anwendung nicht nachgeholt werden. Die nächste Anwendung sollte am dafür vorgesehenen Tag erfolgen.



Der Tag der wöchentlichen Anwendung kann bei Bedarf gewechselt werden, solange die Zeit zwischen zwei Dosen mindestens 3 Tage (> 72 Stunden) beträgt.